



Du
01
MARS.
2017

16h00
-
17h00

RÉGA

Sacha Minets "GIT pour les champs algébriques"

IHP
Salle 314

INSCRIPTION

Sacha Minets (Université Paris-Sud)
GIT pour les champs algébriques

Soit X une variété quasi-projective lisse munie de l'action d'un groupe algébrique affine G . Même dans le cas où cette action est libre, le quotient n'existe pas nécessairement dans la catégorie des variétés algébriques. Cependant, (IHES) dans les années 60, Mumford a inventé une méthode ("Geometric Invariant Theory", ou GIT) qui, étant donné un fibré en droites G -équivariant sur X , produit un ouvert X^s de X , pour lequel le quotient X^s/G existe en tant que variété. Après avoir rappelé les notions de base de GIT, je vais parler d'une généralisation récente, due à D. Halpern-Leistner et J. Heinloth, qui permet d'extraire des sous-variétés ouvertes des champs algébriques. Comme application immédiate, je montrerai comment on peut récupérer la condition de stabilité pour les fibrés vectoriels sur une courbe algébrique lisse C de manière intrinsèque.

URL of the page: <https://www.ihp.fr/fr/agenda/sacha-minets-git-pour-les-champs-algebriques>



INSTITUT HENRI POINCARÉ - UAR839

Sorbonne Université / CNRS
11 rue Pierre et Marie Curie
75231 Paris Cedex 05

HORAIRES

L'institut :

- lundi au vendredi de 8h30 à 18h,
- fermé les jours fériés.

Le musée - Maison Poincaré :

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30,
- samedi de 10h à 18h,
- fermé le mercredi et le dimanche.