



Du
11
FÉV.
2015

16h00
-
17h00

RÉGA

Emmanuel Lepage "Revêtements de variétés analytiques non-archimédiennes"

IHP
Salle 314

INSCRIPTION

Emmanuel Lepage (IMJ)
Revêtements de variétés analytiques non-archimédiennes

Les morphismes étales finis ont permis à Grothendieck de définir un groupe fondamental en géométrie algébrique. En géométrie analytique non-archimédienne, comme en géométrie complexe, certains revêtements infinis apparaissent naturellement. Par exemple, Tate a décrit les courbes elliptiques à mauvaise réduction comme quotient du groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$ par $\mathbb{Z}$. Nous décrirons quelques catégories de revêtements permettant de définir un groupe fondamental.

URL de la page : <https://www.ihp.fr/fr/agenda/emmanuel-lepage-revetements-de-varietes-analytiques-non-archimediennes>



INSTITUT HENRI POINCARÉ - UAR839

Sorbonne Université / CNRS
11 rue Pierre et Marie Curie
75231 Paris Cedex 05

HORAIRES

L'institut :

- lundi au vendredi de 8h30 à 18h,
- fermé les jours fériés.

Le musée - Maison Poincaré :

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30,
- samedi de 10h à 18h,
- fermé le mercredi et le dimanche.